



**Universidad Nacional Mayor de San Marcos**

**Universidad del Perú. Decana de América**

**Facultad de Medicina**

**Escuela Profesional de Obstetricia**

**Factores socioeconómicos y prácticas de prevención del  
cáncer cervicouterino en usuarias del consultorio de  
planificación familiar del Centro de Salud Carlos  
Cueto Fernandini, setiembre - octubre 2017**

**TESIS**

**Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia**

**AUTOR**

**Veronica SUAREZ LOPEZ**

**ASESOR**

**Jenny Elenisse ZAVALETA LUJÁN**

**Lima, Perú**

**2018**



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

## Referencia bibliográfica

---

Suarez V. Factores socioeconómicos y prácticas de prevención del cáncer cervicouterino en usuarias del consultorio de planificación familiar del Centro de Salud Carlos Cueto Fernandini, setiembre - octubre 2017 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Escuela Profesional de Obstetricia; 2018.

---



Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
Universidad del Perú. Decana de América  
Facultad de Medicina

Escuela Profesional de Obstetricia

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"



61P

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TITULO  
PROFESIONAL DE LICENCIADO (A) EN OBSTETRICIA


El jurado designado para evaluar la Sustentación de Tesis, de acuerdo a las "Normas para la Elaboración de Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado (a) en Obstetricia en las Escuelas Profesionales de la Facultad de Medicina", de:


BACHILLER: SUAREZ LOPEZ VERONICA


Cuyo título es: **FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO EN USUARIAS DEL CONSULTORIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL CENTRO DE SALUD CARLOS CUETO FERNANDINI, SETIEMBRE – OCTUBRE 2017.** Reunidos en la fecha, después de la sustentación y resolución de preguntas por el Tesista, acordó el siguiente calificativo:


..... BUENO .....


..... CATORCE ..... 14 .....

  
MG. OBST. CLARA HILDA ROJAS ESPINOZA  
C.O.P. 0132  
PRESIDENTE

  
MG. OBST. GIOVANNA GLADYS PANTE SALAS  
C.O.P. 4420  
MIEMBRO

  
MG. OBST. MARTA LUZUE SUMA  
C.O.P.  
MIEMBRO

  
LIC. OBST. JENNY ELÉNISSE ZAVALETA LUJAN  
C.O.P.  
ASESOR (A)

  
MG. OBST. CLARA HILDA ROJAS ESPINOZA  
C.O.P. 0132  
PRESIDENTE

Lima, 18 de enero del 2018

## RESUMEN

**OBJETIVO:** Identificar los factores socioeconómicos que influyen en las prácticas de prevención del cáncer cervicouterino en usuarias del consultorio de planificación familiar del Centro de Salud Carlos Cueto Fernandini.

**METODOLOGÍA:** Enfoque observacional, analítico, de corte transversal, cuya muestra estuvo conformada por un total de 205 usuarias sexualmente activas atendidas en el Centro de Salud Carlos Cueto Fernandini, las cuales fueron elegidas por muestreo no probabilístico por conveniencia. El instrumento utilizado fue un cuestionario compuesto por 18 preguntas elaboradas tomando como referencia la versión APEIM modificada 2011- 2012 para determinar los factores socioeconómicos. La encuesta fue validada mediante juicio de expertos. Para el procesamiento de datos se utilizó el programa SPSS versión 23 y para el desarrollo de los objetivos se empleó frecuencias, porcentajes (variables cualitativas), así como también la prueba de Chi-cuadrado de Pearson ( $p < 0.05$ ) para determinar asociación de las variables.

**RESULTADOS:** las características de las usuarias son: ama de casa (52,7%), conviviente (46,3%), grado de instrucción secundaria (50,2%), ingresos económicos menores a los S/.1000 mensuales (67,8%) y condición de vivienda sin problemas de hacinamiento (67,3%). Dentro de las prácticas de prevención, el 99% no consume tabaco, el 60,3% no practican conductas sexuales de riesgo, el 94,1% no usan ni han usado anticonceptivos orales combinados por más de 5 años, el 50,2% tienen de 2 a 3 hijos, y el 77,1% se ha tomado la prueba de Papanicolaou dentro de los últimos 3 años. El uso de los anticonceptivos orales combinados por más de 5 años fue más frecuente en las usuarias sin estudios o con estudios primarios ( $p = 0.01$ ); el número de hijos fue mayor en las amas de casa ( $p = 0.001$ ) y en las usuarias con menor grado de estudios ( $p = 0.02$ ); y, respecto a la toma de Papanicolaou, las usuarias que se realizaron la prueba dentro de los últimos 3 años fueron en su mayoría las mujeres con pareja estable ( $p = 0.009$ ) y las amas de casa ( $p = 0.0003$ ).

**CONCLUSIÓN:** el grado de instrucción, el estado civil y la ocupación influyeron significativamente en la realización de prácticas de prevención del cáncer de cuello uterino. No se evidenció influencia significativa de los ingresos económicos y la condición de hacinamiento respecto a las prácticas preventivas.

**PALABRAS CLAVES:** factores socioeconómicos, prácticas de prevención, cáncer de cuello uterino.

## ABSTRACT

**OBJECTIVE:** To identify the socioeconomic factors that influence cervical cancer prevention practices in users of the family planning clinic of the Carlos Cueto Fernandini Health Center.

**METHODS:** Observational, analytical, cross-sectional approach, whose sample consisted of a total of 205 sexually active users attended at the Carlos Cueto Fernandini Health Center, which were chosen by non-probabilistic sampling for convenience. The instrument used was a questionnaire made up of 18 questions elaborated taking as a reference the modified APEIM version 2011-2012 to determine the socioeconomic factors. The survey was validated by expert judgment. The SPSS version 23 program was used for data processing and for the development of the objectives frequencies, percentages (qualitative variables) were used, as well as the Pearson Chi-square test ( $p < 0.05$ ) to determine the association of the variables

**RESULTS:** the characteristics of the users are: housewife (52.7%), partner (46.3%), secondary education degree (50.2%), income less than S / .1000 monthly (67.8%) and housing condition without problems of overcrowding (67.3%). Within the practices of prevention, 99% do not consume tobacco, 60.3% do not practice risky sexual behavior, 94.1% do not use or have used combined oral contraceptives for more than 5 years, 50.2% have between 2 and 3 children, and 77.1% have taken the Pap test within the last 3 years. The use of combined oral contraceptives for more than 5 years was more frequent in users without studies or with primary studies ( $p = 0.01$ ); the number of children was higher in the housewives ( $p = 0.001$ ) and in the users with lower level of studies ( $p = 0.02$ ); and, regarding the Pap smear, the users who underwent the test within the last 3 years were mostly women with a stable partner ( $p = 0.009$ ) and housewives ( $p = 0.0003$ ).

**CONCLUSION:** the level of education, marital status and occupation significantly influenced the performance of cervical cancer prevention practices. There was no significant influence of economic income and the overcrowded condition with respect to preventive practices.

**KEY WORDS:** socioeconomic factors, prevention practices, cervical cancer.